

**定期予防接種(対象年齢期間内は無料で接種できます)**

種類	対象年齢		標準的な接種期間	回数・間隔
ロタウイルス	1価	生後6週～24週まで		2回 間隔:27日以上
	5価	生後6週～32週まで		3回 間隔:27日以上
小児肺炎球菌	生後2か月～5歳未満		初回:2か月～7か月	3回 間隔:27日以上
			追加:初回3回目から 60日以上	1回
BCG	生後1年に至るまで		生後5か月～8か月	1回
百日咳 ジフテリア 破傷風 ポリオ ヒブ (五種混合)	1期  百日咳 ジフテリア 破傷風 ポリオ ヒブ	生後2か月～ 7歳6か月未満	初回:2か月～7か月	3回 間隔:3週間～8週間
	追加:初回3回目終了後 6か月～18か月		1回	
	2期  ジフテリア 破傷風 (二種混合)	11歳～13歳未満	小学校6年生	1回
	1期	1歳～2歳未満		1回
	2期	5歳～7歳未満で小学校就学前の1年間		1回
水痘 (水ぼうそう)	1歳～3歳未満		小学校6年生	2回 間隔:3か月以上
日本脳炎	1期	生後6か月～ 7歳6か月未満	初回:3歳	2回 間隔:6～28日
			追加:4歳 (初回終了から1年後)	1回
	2期	9歳～13歳未満	小学校4年生	1回
B型肝炎	生後1年に至るまで		生後2か月～9か月まで	3回 間隔:2回目は1回目の接種から27日以上 3回目は1回目の接種から139日以上
ヒトパピロー マ ウイルス (子宮頸がん 予防)	2価	小学6年生～高校1年生		1か月以上の間隔をおいて2回 1回目の接種から6か月の間隔で1回
	4価・9価			2か月の間隔をおいて2回 1回目の接種から6か月の間隔で1回